




症狀

依病勢和經過可將本病分為急性限局性炎症、急性瀰漫性炎症及慢性炎症。

1. 發生。
2. 訴痛症狀。
3. 瘤胃運動和反芻微弱或停止。
4. 一般症狀。
5. 末期營養逐漸消瘦、心臟衰弱而黏膜藍紫、顎凹和胸垂浮腫、頸靜脈怒張。
6. 血液學變化。





診斷

臨床上本病之診斷重點為頑固性消化障礙、蜂巢胃部壓痛、運動時訴痛、白血球增多，以金屬探測器檢查時有金屬反應。



治療

1. 投與強力磁鐵棒於第二胃。
2. 肌肉注射廣效性抗生素3~5日。
3. 肌肉注射給予非類固醇消炎藥3~5日。
4. 第一胃切開術。

預防

1. 除去牛舍或周圍環境中有可能被食入之金屬異物。
2. 對10~12個月以上牛隻預先投與強力磁鐵棒。

預防

不管粗料是進口乾草或是青割牧草，唯有投與磁鐵投予磁鐵是預防此病的有效方法，建議牛隻在配種前(體重300-350公斤左右)即可已經口投入磁鐵，預防本病發生。在TMR攪拌機器上裝置強力磁鐵以吸附金屬異物等，都是有效的預防方法。

